Les épillets : un danger silencieux pour nos animaux

Avec l'arrivée des beaux jours, les promenades en forêt ou dans les champs se multiplient. Mais ces balades en apparence inoffensives peuvent cacher un risque pour votre animal : les épillets. Ces petites graines sèches de graminées sauvages peuvent causer de gros soucis s'ils s'incrustent dans le pelage ou la peau des animaux.

Qu'est-ce qu'un épillet ?

Un épillet est une petite partie d'une herbe sauvage (comme le brome, le dactyle ou la folle avoine) qui se détache facilement quand la plante sèche. Il est constitué d'une forme pointue à une extrémité et de petits crochets qui lui permettent de s'accrocher fermement.

Pourquoi est-il dangereux ?

L'épillet est redoutable car :

- Il peut pénétrer la peau de l'animal, entre les doigts, dans les oreilles, les yeux, les narines ou les organes génitaux.
- Une fois entré, il ne ressort pas et progresse sous la peau, causant :
    - des infections,
    - des abcès,
    - des boiteries,
    - voire des atteintes aux organes internes si non traités.

Chien le plus à risque ? Les chiens à poils longs, frisés ou à oreilles tombantes (type Cocker, Cavalier King Charles, Golden Retriever...).

Quels sont les symptômes d'un épillet ?

Selon la zone touchée, vous pouvez observer chez votre animal :

Zone	Signes d'alerte
Oreilles	Secoue la tête, gratte son oreille, tête penchée
Pattes	Boiterie, léchage intense entre les doigts
Yeux	Clignements répétés, œil rouge ou fermé
Nez	Éternuements violents, écoulement nasal unilatéral
Peau	Gonflement, abcès douloureux
Organes génitaux	Léchage excessif, douleur à la miction

Comment s'en prémunir ?

1. Prévention au quotidien
    - Évitez les herbes hautes lors des promenades, surtout en été.
    - Privilégiez les chemins entretenus ou les zones tondues.
2. Toilettage régulier
    - Brossez votre chien après chaque balade.
    - Inspectez minutieusement :
        - les espaces interdigitaux (entre les doigts),
        - les oreilles (intérieur et contour),
        - les yeux, nez, aisselles, cuisse, et l'ensemble du pelage.
3. Tonte ciblée
    - En période à risque (mai à septembre), demandez au toiletteur de raccourcir les poils entre les doigts et autour des oreilles.

Que faire en cas de doute ?

- N'essayez pas d'enlever un épillet en profondeur vous-même, surtout s'il y a une plaie ou un gonflement.
- Consultez un vétérinaire rapidement : il pourra utiliser une pince, un endoscope ou pratiquer une petite chirurgie si nécessaire.